

”， 为何？

今 以 一个乡 反 园出 大 “ ” 。 了

， ， 之一，

可为 叶、 ，以为 和 为主。

”



“ ”

一、危 ：

1、叶 叶后 2~3 即可发 ，叶 、叶 叶 两侧出 不 ，
 叶 到叶 基 ， 叶 下垂，严 个叶丛 ， ，后
 可产 ；

2、 多从 ， 坏 ， 及 呈 ，受
 下垂



二、发 生：

原 为 害 虫 ， 在上一 年（僵） 、 叶和 枝 上 冬 存 ； 条 件 适 宜（ 温 度 20 ℃ 左 右、土 壤 湿 度 30%以 上），产 量 大 ， 传 播 快 ， 侵 害 为 害 叶 片 ， 在 叶 和 枝 上 为 6-7 天 ， 上 部 为 9-10 天 ；

发 生 叶 低 多 ， 发 叶 晚 ； 叶 低 多 ， 侵 害 重 ， 则 受 害 严 重 ； 不 同 地 区 以 及 地 区 内 ， 侵 害 势 头 ， 体 质 不 同 ； 外 部 地 区、土 壤 湿 度 、 不 同 地 区 也 发 生 。

在 了 区 域 、 乡 镇 在 4 月 10 日 右 ， 后 一 般 在 5 月 5-10 日 ， 且 在 内 部 中 在 18℃-23℃， 加之 多 雨 ， 为 传 播 及 侵 害 供 了 利 件 ， 发 生 。

三、 防 治：

- 1、加 强 培 养：增 强 中 元 充 足，增 强 势 头， 力；合 理 修 剪，使 冠 内 光 照 充 足， 后 及 时 修 剪。
- 2、及 时 出 园：出 园 后， 上 部 和 地 僵 、 叶 和 枝 ， 出 园 外 中 间 埋 土，从 减 少 冬 害 ； 发 生 初 期 ， 及 时 剪 除 ， 叶、 枝 。
- 3、剂 量：可 在 前 使 用 国 光 200-300 倍 + 基 肥（50% 基 肥） 600-800 倍 出 园， 使 国 光 利（50% 利）1000-1500 倍（ 发 生 严 重 园）+ 利（80%代 理）800 倍 ， 后 7 天 右 使 用 国 光 健 1500 倍 + 利 800 倍 。

因 区域、品 、 候 件、 件及 培 各 不同， 发
况也会 不同，以上 和 仅供参 ，各 园 况

。